


Wat is IVIg?

Hoe gaat intraveneuze toediening van immunoglobulinen, ook wel IVIg, in zijn werk?

Immunoglobulinen



Als je een afweerstoornis hebt, kan het zijn dat je onvoldoende of geen immunoglobulinen hebt in je lichaam




“ Via een infuus krijg je de immunoglobulinen in je lichaam ”



“ Bij deze toediening krijg je een naald in je ader, in je arm ”

“ De immunoglobulinen zitten direct in je bloed en verspreiden zich door je hele lichaam ”



“ Een IVIg toediening duurt ongeveer 2 tot 3 uur, maar dit is voor iedereen anders ”

“ Hoewel immunoglobulinen helpen je te beschermen tegen ziekteverwekkers, kan je je ook even vervelend voelen na een toediening. Dit heten bijwerkingen ”




Hoofdpijn



Misselijk



“ Je kan bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of je misselijk voelen ”

“ Omdat de immunoglobulinen na verloop van tijd verdwijnen.. ”



“ moet je ze steeds opnieuw toedienen ”

“ Daarom krijg je een IVIg toediening vaak één keer per drie of vier weken ”



“ Er is altijd een verpleegkundige bij deze toediening aanwezig, ook als je de toediening thuis krijgt. ”



Welke toediening het beste bij jou past bepaal je samen met je arts of verpleegkundige. Heb je vragen? Bespreek dit met je arts of verpleegkundige

